

О П Р Е Д Е Л Е Н И И Н Т Е Г Р А Л И (разширен вариант)

0.1. Уводни бележки.

а) Интеграл и лица на фигури.

Класическият въпрос за пресмятане лицата („квadrатурите“) на равнинни фигури с по-сложен контур е причината за появата и развитието на понятието „определен интеграл“. Един характерен клас такива фигури са тези от типа „криволинеен трапец“. За напредъка в отговора на въпроса се оказва достатъчно да можем да пресмятаме лице на криволинеен трапец с единствено „криволинейно“ бедро, представляващо графика на функция. Такъв един трапец можем лесно да построим по следния начин. Нека $y = f(x)$ е дадена функция, дефинирана и непрекъсната в крайния и затворен интервал $a \leq x \leq b$. Върховете на нашия трапец ще са точките $A(a, 0)$, $B(b, 0)$, $C(b, f(b))$, $D(a, f(a))$ (направете чертеж !). Частта от графиката на функцията $f(x)$, кривата $\Gamma_f = \{(x, y) : x \in [a, b], y = f(x)\}$, която свързва върховете D и C , ще означим за удобство с $\overset{\cup}{CD}$. За простота ще считаме, че $0 < f(a) < f(b)$ и кривата $\overset{\cup}{CD}$ лежи изцяло над абсцисната ос. Ролята на основи на трапеца (съответно малка и голяма) играят вертикалните отсечки AD и BC . Отсечката AB (от абсцисната ос) е едното бедро, а кривата $\overset{\cup}{CD}$ е другото. Въпросът, който ни интересува е как да пресметнем лицето на „трапеца“ $AB\overset{\cup}{CD}$? (Допълнителен коментар в тази насока е даден в т. 3 б), по-долу.)

За решаването на въпроса исторически известни са два подхода – на Риман (Георг Фридрих Риман, 1826 – 1866, немски математик) и Дарбу (Жан Гастон Дарбу, 1842 – 1917, френски математик). Изходните идеи и в двата подхода произтичат от аналогията с квадратурата (лицето) на кръга – като обща граница на редици от лица на вписани и описани фигури с по-проста геометрия (правилни n -тоъгълници).

б) Дефинициите на Риман и Дарбу.

Римановата дефиниция на определен интеграл (като величина със смисъл на лице на „трапец“ като $AB\overset{\cup}{CD}$) си служи с крайни суми от вида:

$$(0.1) \quad \sigma_n[f] = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}).$$

В горния израз са използвани две системи от точки от интервала $[a, b]$: $\{x_i\}, i = 0, 1, 2, \dots, n$ и $\{\xi_k\}, k = 1, 2, \dots, n$, като $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$, а за системата от ξ -точките имаме, че $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i], \forall i = 1 \div n$ (т.е. $x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i$). Системата точки $\{x_i\}$ (делящи интервала $[a, b]$ на съседни подинтервали $[x_{i-1}, x_i]$) можем да наричаме система „опорни възли“, а точките $\{\xi_k\}$ – междинни точки („възли“). Ако направим чертеж на „трапеца“ $AB\overset{\cup}{CD}$ и върху същия чертеж

нанесем в интервала $[a, b]$ точките $\{x_i\}$ и междинните ξ -точки, непосредствено се вижда, че величината $\sigma_n[f]$ е всъщност сумата от лицата на съседни (долепени един до друг) правоъгълници: в частност k -тият от тях има дължина на основата $x_k - x_{k-1}$ и височина $= f(\xi_k)$, т.е. лицето му е равно на $(x_k - x_{k-1})f(\xi_k)$. С други думи, ако наречем „риманов полигон“ фигурата, съставена от долепените правоъгълници, числото $\sigma_n[f]$ е стойността на лицето на полигона. Сумите $\sigma_n[f]$ обикновено се наричат риманови интегрални суми.

Да означим с Δ_n^{\max} максималната от дължините $|x_i - x_{i-1}|, i = 1 \div n$ (на подинтервалите $[x_{i-1}, x_i]$). В конструкциите на Риман и Дарбу се имат предвид всевъзможни системи от опорни възли $\{x_i\}$, удовлетворяващи естественото предположение, че, при $n \rightarrow \infty$, дължините на споменатите подинтервали клонят към нула, т.е.:

$$(0.2) \quad \Delta_n^{\max} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Дефиницията на Риман можем да формулираме по следния начин. Нека функцията $y = f(x)$ е дефинирана в интервала $[a, b]$. Ще казваме, че $f(x)$ е интегрируема или, че притежава определен интеграл (в смисъл на Риман), в интервала $[a, b]$, ако:

(i) Всички безкрайни редици $\{\sigma_n[f]\}$ са сходящи (при $n \rightarrow \infty$) и клонят към една и съща граница; т.е. \exists число $I : \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n[f] = I, \forall$ редица $\{\sigma_n[f]\}$.

(ii) Сходимостта на редиците $\{\sigma_n[f]\}$ не зависи от междинните възли $\{\xi_k\}$, в следния смисъл. За всяко (в т.ч. произволно малко) число $\varepsilon > 0$ \exists положително число δ (изобщо зависещо от ε , т.е. $\delta = \delta(\varepsilon)$), така че неравенството $|\sigma_n[f] - I| < \varepsilon$ е изпълнено за всички $n : \Delta_n^{\max} < \delta$, за всяка редица $\{\sigma_n[f]\}$ и произволна система междинни възли $\{\xi_k\}$.

В такъв случай числото I наричаме *определен (риманов) интеграл на функцията $f(x)$* и вместо с I си служим с означението $\int_a^b f(x)dx$; числата a и b

наричаме съответно долна и горна интеграционна граница. (Последния символ четем като „определен интеграл, в граници от a до b , от/на функцията $f(x)$.)

Ограниченост на интегрируемите (по Риман) функции. Оказва се, че, ако една функция $f(x)$ е интегрируема по Риман, в даден интервал $[a, b]$, тя е ограничена (за $x \in [a, b]$). Доказателството (което не е сложно) на това твърдение, може да се види например в учебника на проф. Тагамлицки /1) Я. Тагамлицки, Интегрално смятане, изд. Наука и изкуство, София, 1967 /.

В конструкцията на Дарбу се предполага, че разглежданите функции са *ограничени* ($x \in [a, b]$) и се използват съвместно две фамилии интегрални суми, сходни с римановите, като вместо $f(\xi_i)$ участват величините $m_i = \inf f(x), x \in [x_{i-1}, x_i]$ или $M_i = \sup f(x), x \in [x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \dots, n$):

$$(0.3) \quad s_n[f] = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}), \quad S_n[f] = \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1}).$$

Сумите $s_n[f]$, $S_n[f]$ се наричат съответно малка и голяма (интегрална) сума на Дарбу. (За удобство, на числата m_i , M_i можем да гледаме съответно като на $\min f(x)$ и $\max f(x)$, $x \in [x_{i-1}, x_i]$; да припомним, че – от теоремата на Вайерщрас

– когато $f(x)$ е непрекъснатата функция, за $x \in [a, b]$, валидни са равенствата $\inf f(x) = \min f(x)$ и $\sup f(x) = \max f(x)$.) Не е трудно да съобразим (вж. напр. учебника [1]), че всяка безкрайна редица от малки суми $\{s_n[f]\}$ е монотонно растяща, ако всеки неин член е сума, със система опорни възли, включваща системите на членовете с по-малък номер. (Последното означава, че системата възли на сумата $s_{k+1}[f]$ включва всички опорни възли на сумата $s_k[f]$, $\forall k = 1, 2, 3, \dots$.) При същите обстоятелства, всяка редица от големи суми $\{S_n[f]\}$ е монотонно намаляваща. От тук се стига, сравнително просто (вж. [1]), до заключението, че, сравнявайки коя да е малка сума s със произволна голяма сума S , ще е изпълнено неравенството:

$$(0.4) \quad s \leq S.$$

(Наистина, произволна двойка величини s и S са суми от вида $s = s_l$ и $S = S_m$, където $l+1$ е броят на опорните възли на s /съответно $m+1$ са възлите на S /. Като обединим двете системи възли и „сгъстим“ допълнително това обединение, поставяйки „нови“ възли между „старите“, ще получим система от $N+1$ възела, такава че $l+m+1 < N$, а възлите на s и S са част от тази система. Тогава от споменатите по-горе видове монотонност – при редици от малки и големи суми – виждаме, че $s_l \leq s_N$ и $S_N \leq S_m$; същевременно: $s_N \leq S_N$ – очевидно, понеже $m_N \leq M_N$. Т.е. имаме, че: $s = s_l \leq s_N \leq S_N \leq S_m = S$, значи $s \leq S$.) Ако S^0 е произволна фиксирана стойност на големите суми S , неравенството $s \leq S^0$, валидно за всяка малка сума s , означава, че множеството на малките суми е ограничено отгоре; тогава от принципа за непрекъснатост (вж. лекцията за безкрайни числови редици) следва, че \exists число $I_* = \sup\{\text{Множеството на сумите } s\}$, $s \leq I_* \leq S^0, \forall$ малка сума s . Но S^0 беше произволна измежду големите суми на Дарбу, значи $I_* \leq S, \forall$ голяма сума S ; т.е. множеството на големите суми е ограничено отдолу и (от принципа за непрекъснатост) – \exists число $I^* = \inf\{\text{Множеството на сумите } S\}$, $I_* \leq I^* \leq S, \forall$ голяма сума S . Заедно с предходното неравенство $s \leq I_*$ така получаваме, че $s \leq I_* \leq I^* \leq S$, за всички малки и големи суми на Дарбу. Числата I_* и I^* наричаме съответно *долен и горен интеграл на Дарбу*. За тях е в сила следното твърдение.

Теорема на Дарбу.

Нека $f(x)$ е функция, дефинирана и ограничена в интервала $[a, b]$. При условието (0.2), всички редици от малки суми $\{s_n[f]\}$, както и всички редици от големи суми $\{S_n[f]\}$, са сходящи и клонят (при $n \rightarrow \infty$) съответно към I_* и I^* ; т.е.:

$$(0.5) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_n[f] = I_*; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n[f] = I^*.$$

(Доказателството на това твърдение може да се види в учебника [1].)

Дефиниция на Дарбу. Ако $f(x)$ е функция, дефинирана и ограничена в интервала $[a, b]$, ще казваме, че тя е интегрируема (или, че притежава определен интеграл) в интервала $[a, b]$, ако е изпълнено равенството $I_* = I^*$; общата стойност $I = I_* = I^*$ ще означаваме също с $\int_a^b f(x) dx$.

Предвид (0.5), очевидно ако функцията $f(x)$ е интегрируема (в смисъл на Дарбу), интегралът е обща граница на двата вида редици от интегрални суми:

$$(0.6) \quad \int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n[f] = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n[f].$$

в) Еквивалентност и разширение на дефинициите.

Еквивалентност. Двете дефиниции – на Риман и Дарбу – се оказват еквивалентни, в следния смисъл. Ако $f(x)$ е интегрируема по Риман функция (в даден интервал $[a, b]$), тя е – като следствие – ограничена (както вече отбелязахме) и освен това – интегрируема в смисъл на Дарбу, при което интегралите $\int_a^b f(x)dx$ [по Риман] и $\int_a^b f(x)dx$ [по Дарбу] са равни. И обратно, ако $f(x)$ е ограничена функция, интегрируема по Дарбу, тя е интегрируема и по Риман (и двата интеграла имат една и съща стойност). Доказателството, че от интегрируемост по Дарбу следва интегрируемост и по Риман, е на практика очевидно, предвид неравенствата $m_i \leq f(\xi_i) \leq M_i$, $i = 1, 2, \dots, n$; като умножим почленно неравенствата с $x_i - x_{i-1}$ и сумираме по i (от $i=1$ до $i=n$), намираме, че $s_n[f] \leq \sigma_n[f] \leq S_n[f]$, а от тук, предвид (0.6), при $n \rightarrow \infty$, стигаме до желаното заключение. Доказателството в обратната посока (от „Риман” към „Дарбу”) е незначително по-трудоемко; тук ще пропуснем подробностите, които могат да се видят в учебника [1].

Разширения на дефинициите. Най-напред ще отбележим, че ако номерираме възлите на всевъзможните системи $\{x_i\}$ от дясно на ляво, т.е. $a = x_n < x_{n-1} < x_{n-2} < \dots < x_1 < x_0 = b$, и повторим конструкцията на Дарбу (за дадена ограничена в интервала $[a, b]$ функция $f(x)$), ще получим дефиниция (по Дарбу) за определен интеграл $\int_b^a f(x)dx$ – този път интегрирането е от b до a .

Аналогична дефиниция на интеграл $\int_b^a f(x)dx$ и в смисъл на Риман можем да получим, номерирайки от дясно на ляво и системите от междинни точки $\{\xi_i\}$. Ако едно и също множество от опорни x -възли веднъж номерираме от ляво на дясно, а после го преномерираме от дясно на ляво, непосредствено се вижда, например за големите суми на Дарбу, следното. Нека $S^f \Big|_a^b$ е голямата сума, определена от системата x -възли при номерирането на дясно, а $S^f \Big|_b^a$ – голямата сума, която получаваме от същите възли, при номерирането на ляво. Ако едно от събираемите в $S^f \Big|_a^b$ е например $M_i(x_i - x_{i-1})$, участващите в него точки x_{i-1}, x_i и числото M_i , при преномерирането са записани съответно като x_k, x_{k-1} и M_k (където $k = n - i$) и участват в $S^f \Big|_b^a$ посредством събираемото $M_k(x_k - x_{k-1})$; но $M_k = M_i$, а $x_k - x_{k-1} = x_{i-1} - x_i = -(x_i - x_{i-1})$, значи $S^f \Big|_b^a = -S^f \Big|_a^b$, откъдето (след граничен преход, $n \rightarrow \infty$) следва, че $\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$. Чрез последния коментар всъщност се убеждаваме, че е в сила *твърдението*: ако за дадена

функция $f(x)$ съществува интегралът $\int_a^b f(x)dx$, то съществува и $\int_b^a f(x)dx$, при което е изпълнено равенството $\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$.

Предвид геометричния смисъл на определения интеграл – като лице на фигура, разположена между вертикалите $x = a$ и $x = b$, интуитивно е видимо, че когато $b \approx a$, лицето ще е приблизително нула. По тази причина е естествено следното допълнение към дефиницията за определен интеграл (позволяващо да „интегрираме“ между съвпадащи интеграционни граници). За произволна т.

$c \in [a, b]$, по дефиниция имаме: $\int_c^c f(x)dx = 0$.

г) Основни случаи на интегрируеми функции.

Посредством следните класове от функции, с най-масова употреба във всевъзможни приложения, отговаряме на естествения въпрос дали има „достатъчно много“ функции, притежаващи определен интеграл.

(I) Всички непрекъснати функции в даден интервал $[a, b]$ са интегрируеми.

(II) Всички функции, имащи краен брой точки на прекъсване в интервала $[a, b]$, са интегрируеми в този интервал.

(III) Всички монотонни функции в интервала $[a, b]$ са интегрируеми в него.

Коментар. 1) Ясно е, че можем да имаме монотонни функции, имащи безкрайно много точки на прекъсване в интервала $[a, b]$. 2) Доказателствата на горните твърдения (чието разбиране не изисква никакви извънредни способности) могат да се намерят например в учебника [1].

1. Начални основни свойства.

Естествената първа двойка свойства са тези, които показват, че операцията “интегриране” е *линейна*, което, заедно с очевидния факт, че тривиалната функция $f(x) \equiv 0$ е интегрируема (в смисъл на Риман) във всеки интервал $[a, b]$, означава, че множеството на интегрируемите в даден интервал $[a, b]$ функции е *линейно пространство*. Тези свойства разглеждаме в първото твърдение по-долу.

Твърдение 1. За функциите, интегрируеми в даден интервал $[a, b]$, е в сила следното:

а) За всяка интегрируема функция $f(x)$ и всяко число c , функцията $cf(x)$ е също интегрируема (в $[a, b]$) и е изпълнено равенството:

$$\int_a^b cf(x) dx = c \int_a^b f(x) dx;$$

б) Ако $f_1(x), f_2(x)$ са интегрируеми функции, то и сумата им $f_1(x) + f_2(x)$ е интегрируема и е в сила равенството:

$$\int_a^b [f_1(x) + f_2(x)] dx = \int_a^b f_1(x) dx + \int_a^b f_2(x) dx.$$

За да докажем твърдението от а), нека $\{\sigma_n[cf]\}$ е безкрайна редица от риманови интегрални суми на функцията $cf(x)$, за която $\Delta_n^{\max} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. (Да припомним, че Δ_n^{\max} е най-голямата от дължините на подинтервалите $[x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \dots, n$) За сумата $\sigma_n[cf]$ очевидно е изпълнено равенството

$$(1.1) \quad \sigma_n[cf] \equiv \sum_{i=1}^n cf(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = c \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = c\sigma_n[f],$$

където за точките $\{\xi_i\}$ имаме, че $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ и $\sigma_n[f]$ е римановата сума на функцията $f(x)$, съответстваща на системата дялящи точки $\{x_i\}$ и системата междинни точки $\{\xi_i\}$. Но редицата с общ член $\sigma_n[f]$ е сходяща и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n[f] = \int_a^b f(x) dx,$$

понеже $\Delta_n^{\max} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ и функцията $f(x)$ е интегрируема по предположение. Сега от (1.1), при $n \rightarrow \infty$, следва, че и редицата $\{\sigma_n[cf]\}$ е сходяща и границата ѝ е $c \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n[f]$, т.е. $c \int_a^b f(x) dx$. Но, предвид че редицата $\{\sigma_n[cf]\}$ беше произволно избрана, полученото означава (съгласно дефиницията на Риман), че функцията $cf(x)$ е интегрируема, при което за интеграла ѝ $\int_a^b cf(x) dx$ е изпълнено желаното равенство от а).

За да докажем б), работим по същия начин (както в а)): нека $\sigma_n[f_1 + f_2]$ е общият член на произволна редица от риманови суми на функцията $f_1(x) + f_2(x)$ (за която имаме, че $\Delta_n^{\max} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$). От свойството “линейност” на крайните суми (състоящи се от краен брой събираеми) веднага се вижда, че $\sigma_n[f_1 + f_2] = \sigma_n[f_1] + \sigma_n[f_2]$. От тук, след граничен преход, при $n \rightarrow \infty$, получаваме твърдението от б). (В последната стъпка сме взели предвид, че по предположение всяка от функциите $f_1(x), f_2(x)$ е интегрируема и по тази причина редиците $\{\sigma_n[f_1]\}, \{\sigma_n[f_2]\}$ са сходящи и клонят съответно към интегралите

$$\int_a^b f_1(x) dx, \int_a^b f_2(x) dx .)$$

Твърдение 2 (Интегрируемост в подинтервали, адитивност). Една функция $f(x)$, дефинирана в интервала $[a, b]$ е тогава и само тогава интегрируема в този интервал, когато е интегрируема във всеки негов (затворен) подинтервал.

Освен това, ако $f(x)$ е интегрируема в $[a, b]$ и т. $c \in [a, b]$ е произволна вътрешна точка, в сила е следното равенство (адитивност):

$$(1.2) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

За доказателството на това твърдение ще разсъждаваме по следния начин. Първо, ако $f(x)$ е интегрируема в $[a, b]$ функция и $c \in [a, b]$ е вътрешна точка, ще се убедим, че $f(x)$ е интегрируема във всеки от интервалите $[a, c]$ и $[c, b]$. За да установим интегрируемост например в $[a, c]$, нека $\{\sigma_n^a\}$ е редица от риманови интегрални суми на $f(x)$ за интервала $[a, c]$ (за която имаме, че $\Delta_n^{\max}[a, c] \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$); да изберем и една редица $\{\sigma_n^b\}$ -- от риманови суми на $f(x)$ -- за $[c, b]$ (за която също имаме: $\Delta_n^{\max}[c, b] \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$). Понеже функцията $f(x)$ е ограничена в $[a, b]$ (и във всеки от подинтервалите $[a, c]$, $[c, b]$), всяка от редиците, $\{\sigma_n^a\}$, $\{\sigma_n^b\}$ е ограничена. Сега от известната *теорема на Болцано-Вайерщрас* (за ограничени редици) – и еквивалентната ѝ форма – известна като *принцип за компактност*, приложени за редицата $\{\sigma_n^b\}$, можем да си изберем една нейна сходяща подредица $\{\sigma_n^{b,0}\}$. Имаме да установим, че всяка редица $\{\sigma_n^a\}$ от горепосочения тип е сходяща и че всеки две такива редици имат една и съща граница (която, в такъв случай, ще можем да означим като $\int_a^c f(x) dx$).

За сходимостта на $\{\sigma_n^a\}$ е достатъчно да покажем, че тази редица има единствена точка на сгъстяване (която ще е и нейната граница). Но, ако допуснем, че съществуват (поне) две различни нейни точки на сгъстяване, от споменатия *принцип за компактност* ще можем да изберем двойка сходящи подредици $\{\sigma_n^{a,I}\}$, $\{\sigma_n^{a,II}\}$ на редицата $\{\sigma_n^a\}$, сходящи към различни граници. Обединявайки

системите делящи точки на сумите $\sigma_n^{a,I}$ и $\sigma_n^{b,0}$ (така че точката $x_n^{a,I}$ -- последна в

системата за $\sigma_n^{a,I}$ и точката x_0^b -- най-лявата в системата за $\sigma_n^{b,0}$ да съвпадат с т. c), получаваме една система делящи точки за целия интервал $[a, b]$. Чрез така

получената система точки конструираме сумата σ_{2n}^I , която очевидно е риманова интегрална сума на $f(x)$ за интервала $[a, b]$, представляваща общ член на редица от такива суми, удовлетворяваща условието $\Delta_{2n}^{\max}[a, b] \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. По същия

начин, от $\sigma_n^{a,II}$ и отново $\sigma_n^{b,0}$ конструираме и още една редица $\{\sigma_{2n}^{II}\}$ -- отнасяща се за $f(x)$ в целия интервал $[a, b]$. Обаче и двете редици $\{\sigma_{2n}^I\}$, $\{\sigma_{2n}^{II}\}$ са сходящи

– към обща граница – интеграла $\int_a^b f(x) dx$ -- от предположението, че $f(x)$ е

интегрируема в $[a, b]$. От тук, понеже $\sigma_{2n}^{II} - \sigma_{2n}^I = \sigma_n^{a,II} - \sigma_n^{a,I}$, следва, че разликата

$\sigma_n^{a,II} - \sigma_n^{a,I}$ клони към θ , при $n \rightarrow \infty$, което означава, че гореспоменатите точки на съгъстване за $\{\sigma_n^a\}$ не може да са различни. Значи всяка редица от типа $\{\sigma_n^a\}$ е сходяща. Остава да се убедим, че всеки две такива редици имат една и съща граница. Ако $\{\sigma_n^{a,1}\}$ и $\{\sigma_N^{a,2}\}$ са две такива редици от всяка от тях и редицата $\{\sigma_n^{b,0}\}$ по познатия начин образуваме двойка редици от риманови суми, с общи членове съответно

$$\sigma_{2n}^{(1)} = \sigma_n^{a,1} + \sigma_n^{b,0}, \quad \sigma_{2N}^{(2)} = \sigma_N^{a,2} + \sigma_N^{b,0},$$

които (съответно при $n \rightarrow \infty$ и $N \rightarrow \infty$) клонят към общата си граница $\int_a^b f(x) dx$. Освен това редиците $\{\sigma_n^{b,0}\}$ и $\{\sigma_N^{b,0}\}$ по построение са идентични.

Тогава и редиците $\{\sigma_n^{a,1}\}$, $\{\sigma_N^{a,2}\}$ имат една и съща граница. С това доказахме, че $f(x)$ е интегрируема в $[a, c]$. Чрез същите разсъждения, проведени за интервала $[c, b]$, получаваме, че $f(x)$ е интегрируема и в този подинтервал на $[a, b]$. Сега от произволна двойка редици $\{\sigma_n^a\}$, $\{\sigma_n^b\}$, клонящи (при $n \rightarrow \infty$) съответно към

$\int_a^c f(x) dx$ и $\int_c^b f(x) dx$, по добре известния вече начин конструираме редицата с общ член $\sigma_{2n} = \sigma_n^a + \sigma_n^b$, която е сходяща и клони (при $n \rightarrow \infty$) към $\int_a^b f(x) dx$.

Следователно, след граничния преход ($n \rightarrow \infty$) в равенството $\sigma_{2n} = \sigma_n^a + \sigma_n^b$ получаваме формулата (1.2) (т.е. свойството *адитивност*).

Забележка. Свойството *адитивност* е в сила и в следния по-общ вариант: Ако $x_1, x_2, x_3 \in [a, b]$ е произволна тройка числа (от интервала $[a, b]$), независимо от посоката на неравенствата помежду им (като някои от тях могат и да съвпадат) и $f(x)$ е интегрируема в $[a, b]$, в сила е равенството:

$$(1.3) \quad \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^{x_3} f(x) dx = \int_{x_1}^{x_3} f(x) dx.$$

За да се убедим във валидността на (1.3), ще имаме предвид, че щом $f(x)$ е интегрируема в $[a, b]$, тя е интегрируема и във всеки (затворен) подинтервал на $[a, b]$ и за всяка двойка числа $t_1, t_2 \in [a, b]$ от разширението на дефиницията за

интегрируемост имаме, че $\int_{t_1}^{t_2} f(x) dx = - \int_{t_2}^{t_1} f(x) dx$; освен това ще имаме предвид и че

по дефиниция : $\int_{t_0}^{t_0} f(x) dx = 0$, за всяка т. $t_0 \in [a, b]$. Нека например $x_1 \leq x_3 < x_2$. Ако

$x_1 = x_3$, то $\int_{x_1}^{x_3} f(x) dx = \int_{x_1}^{x_1} f(x) dx = 0$, равенството (1.3) добива вида

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^{x_1} f(x) dx = 0$$

и е очевидно в сила (понеже, както вече отбелязахме: $\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = -\int_{x_2}^{x_1} f(x) dx$).

Когато $x_1 < x_3$, за интервала $[x_1, x_2]$ прилагаме (1.2):

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = \int_{x_1}^{x_3} f(x) dx + \int_{x_3}^{x_2} f(x) dx, \text{ т.е. } \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx - \int_{x_3}^{x_2} f(x) dx = \int_{x_1}^{x_3} f(x) dx,$$

което всъщност е желаното (1.3) (предвид че $\int_{x_2}^{x_3} f(x) dx = -\int_{x_3}^{x_2} f(x) dx$).

За да завършим с доказателството на *Твърдение 2*, нека сега (по предположение) $f(x)$ е интегрируема в затворените подинтервали на $[a, b]$. Трябва да докажем, че функцията е интегрируема и в самия (целия) интервал $[a, b]$. За целта можем да си служим например с подхода на Дарбу, предвид че функцията $f(x)$ е ограничена в $[a, b]$ (това е така, защото, във всяка произволна вътрешна т. c ($c \in (a, b)$), във всеки от подинтервалите $[a, c]$ и $[c, b]$ ще имаме, че $f(x)$ е ограничена – от предположената интегрируемост в подинтервали – и следователно е ограничена в целия интервал $[a, b]$). Да построим от една и съща система делящи точки $\{x_i\}, i = 1, 2, \dots, n$, съответната двойка голяма и малка сума на Дарбу, S_n и s_n . Ясно е, че системата точки $\{x_i\}$ ще се мени, когато меним индекса n , т.е. системата точки $\{x_i\} = \{x_i^{(n)}\}$ -- зависи от n . Ще използваме такива редици $\{S_n\}$ и $\{s_n\}$, за които редицата $\{\Delta_n^{\max}\}$ -- от максималните дължини на подинтервалите $[x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)}]$ клони към 0 , когато $n \rightarrow \infty$, т.е.: $x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), $\forall i = 1, 2, \dots, n$. Ако c ($c \in (a, b)$) е произволно, фиксирано число, към системата точки (“възли”) $\{x_i\} = \{x_i^{(n)}\}$, при всяко дадено n , да прибавим (включим) и т. c и от така разширената система “възли” (с един повече от досегашните) да образуваме съответните голяма и малка суми на Дарбу, които ще означим със S_n^c и s_n^c . Така получаваме редиците $\{S_n^c\}, \{s_n^c\}$, за които продължава да е в сила условието дължините на подинтервалите между “възлите” да клонят към 0 (при $n \rightarrow \infty$); за краткост това условие ще запишем по следния начин: $\Delta_n^{c, \max} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

От известните съотношения $s_n^c \leq I_* \leq I^* \leq S_n^c$ (където I_*, I^* съответно са долният и горният интеграл на Дарбу за функцията $f(x)$ в интервала $[a, b]$) непосредствено следват неравенствата

$$(1.4) \quad 0 \leq I^* - I_* \leq S_n^c - s_n^c.$$

Но за всяко $n=1,2,\dots$ има подинтервал $[x_k^{(n)}, x_{k+1}^{(n)}]$, който съдържа т. c , т.е. $x_k^{(n)} \leq c \leq x_{k+1}^{(n)}$ (да отбележим, че номерът k зависи от n , т.е. $k = k(n)$); тогава

$$S_n^c = S_{[a,c]}^{(n),'} + S_{[c,b]}^{(n),''}, \text{ където}$$

$$S_{[a,c]}^{(n),'} = \sum_{i=1}^k (x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)})M_i + (c - x_k^{(n)})M'_{k+1},$$

$$S_{[c,b]}^{(n),''} = (x_{k+1}^{(n)} - c)M''_{k+1} + \sum_{i=k+2}^k (x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)})M_i;$$

аналогично $S_n^c = S_{[a,c]}^{(n),'} + S_{[c,b]}^{(n),''}$,

$$s_{[a,c]}^{(n),'} = \sum_{i=1}^k (x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)})m_i + (c - x_k^{(n)})m'_{k+1}, \quad s_{[c,b]}^{(n),''} = (x_{k+1}^{(n)} - c)m''_{k+1} + \sum_{i=k+2}^k (x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)})m_i.$$

По-горе величините m_i, M_i са съответно *инфимумът* и *супремумът* на функцията $f(x)$ за подинтервала $[x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)}]$; m'_{k+1}, M'_{k+1} -- за $[x_k^{(n)}, c]$ и m''_{k+1}, M''_{k+1} -- за $[c, x_{k+1}^{(n)}]$. Ясно е че $\{S_{[a,c]}^{(n),'}\}, \{S_{[c,b]}^{(n),''}\}$ са редици от големи суми на Дарбу, отнасящи се съответно за интервалите $[a, c]$ и $[c, b]$, като условията (да клонят към θ дължините на съответните подинтервали между “възлите”от $[a, c]$ и $[c, b]$) -- $\Delta_n^{c, \max}([a, c]) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ и $\Delta_n^{c, \max}([c, b]) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ са налице. Но по условие $f(x)$ е интегрируема в подинтервалите $[a, c]$ и $[c, b]$, следователно, по теоремата на Дарбу:

$$S_{[a,c]}^{(n),'} \rightarrow \int_a^c f(x) dx (n \rightarrow \infty) \text{ и } S_{[c,b]}^{(n),''} \rightarrow \int_c^b f(x) dx (n \rightarrow \infty); \text{ т.е.}$$

$$S_n^c \rightarrow \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx (n \rightarrow \infty).$$

По същия начин се вижда и че

$$s_n^c \rightarrow \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx (n \rightarrow \infty)$$

-- тъй като и за редиците от малки суми $\{s_{[a,c]}^{(n),'}\}, \{s_{[c,b]}^{(n),''}\}$ имаме (отново от теоремата на Дарбу), че

$$s_{[a,c]}^{(n),'} \rightarrow \int_a^c f(x) dx (n \rightarrow \infty) \text{ и } s_{[c,b]}^{(n),''} \rightarrow \int_c^b f(x) dx (n \rightarrow \infty).$$

Сега от граничния преход, $n \rightarrow \infty$, в (1.4) заключаваме, че $0 \leq I^* - I_* \leq 0$, т.е.

$$I^* = I_*, \text{ с което доказахме, че } f(x) \text{ е интегрируема в } [a, b].$$

Твърдение 3 (Интегриране на неравенства). Ако $f(x)$ и $g(x)$ са функции, дефинирани и интегрируеми в интервала $[a, b]$, и удовлетворяват в този интервал неравенството $f(x) \leq g(x) (\forall x \in [a, b])$ то и за интегралите им е изпълнено неравенство в същата посока:

$$(1.5) \quad \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

За да докажем неравенството (1.5), можем да използваме както редици от големи суми на Дарбу, $\{S_n\}$, така и от Риманови интергални суми, $\{\sigma_n\}$, или пък – от малки суми на Дарбу, $\{s_n\}$, за които редицата $\{\Delta_n^{\max}\}$ -- от максималните дължини на подинтервалите $[x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)}]$ клони към θ , когато $n \rightarrow \infty$, т.е.: $x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), $\forall i = 1, 2, \dots, n$. Нека например $\{s_n[f]\}, \{s_n[g]\}$ са двойка редици от малки суми на Дарбу, с горното свойство за дължините на подинтервалите $[x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)}]$, построени съответно за функциите f и g , чрез обща ($\forall n, n = 1, 2, \dots$) система от “възли” $\{x_i^{(n)}\}$. Ако $m_i[f]$ и $m_i[g]$ съответно са инфимумите на f и g за подинтервала $[x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)}]$, от неравенството $f(x) \leq g(x)$, валидно (по условие) в частност и за $x_{i-1}^{(n)} \leq x \leq x_i^{(n)}$, непосредствено следва, че $m_i[f] \leq m_i[g]$. От тук е очевидно, че $s_n[f] \leq s_n[g], \forall n, n = 1, 2, \dots$ (понеже, както знаем, всяка малка сума на Дарбу има вида $s_n = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1})$). Сега извършваме граничен преход в неравенството $s_n[f] \leq s_n[g] (n \rightarrow \infty)$ и получаваме желаното (1.5), предвид че $s_n[f] \rightarrow \int_a^b f(x) dx$ и $s_n[g] \rightarrow \int_a^b g(x) dx$, при $n \rightarrow \infty$ -- по теоремата на Дарбу.

Твърдение 4 (Интегруемост по абсолютна стойност). Ако $f(x)$ е интегрируема функция в даден интервал $[a, b]$, то и функцията $|f(x)|$ (със стойности – абсолютните стойности на f) е интегрируема в този интервал, при което е изпълнено следното **неравенство на триъгълника** (интегрална форма):

$$(1.6) \quad \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Доказателство. Нека $[x_{i-1}, x_i] \subset [a, b]$ е произволен подинтервал и $t, s \in [x_{i-1}, x_i]$ са произволна двойка числа от подинтервала. За стойностите $f(s)$ и $f(t)$, от известното неравенство на триъгълника между числа, са изпълнени едновременно следните неравенства:

$$|f(t)| - |f(s)| \leq |f(t) - f(s)|, |f(s)| - |f(t)| \leq |f(t) - f(s)|;$$

следователно: $\left| |f(t)| - |f(s)| \right| \leq |f(t) - f(s)|$. От тук е ясно, че, ако M_i и m_i съответно са супремумът и инфимумът на $f(x)$ за интервала $[x_{i-1}, x_i]$, имаме неравенството: $\left| |f(t)| - |f(s)| \right| \leq M_i - m_i$. Да означим сега с M_i^0 и m_i^0 съответно супремума и инфимума на $|f(x)|$ за интервала $[x_{i-1}, x_i]$. От дефинициите на супремум и инфимум е ясно, че можем да изберем двойка числови редици $\{t_n\}, \{s_n\}$, чиито елементи са числа от интервала $[x_{i-1}, x_i]$, за които редиците $\{|f(t_n)|\}$ и $\{|f(s_n)|\}$ клонят (при $n \rightarrow \infty$) съответно към M_i^0 и m_i^0 . Като се

възползваме от неравенството $\|f(t) - f(s)\| \leq M_i - m_i$, при $t = t_n, s = s_n$, имаме, че $\|f(t_n) - f(s_n)\| \leq M_i - m_i, \forall n = 1, 2, \dots$, откъдето (при $n \rightarrow \infty$) получаваме: $M_i^0 - m_i^0 \leq M_i - m_i$. Да умножим последното неравенство почленно по разликата $x_i - x_{i-1}$ и да сумираме по i ($i=1, 2, \dots, N$, ако N е броят на “възлите” $\{x_i\}$). Така заключаваме, че двойките от големи и малки суми на Дарбу, S_N, s_N и S_N^0, s_N^0 -- съответно за функциите $f(x)$ и $|f(x)|$ удовлетворяват неравенството

$$(1.7) \quad S_N^0 - s_N^0 \leq S_N - s_N,$$

когато са построени чрез една и съща система “възли”. Сега да изберем една двойка редици $\{S_N\}$ и $\{s_N\}$, чиито общи членове (S_N и s_N) са построени от една и съща система “възли”, с дължини между съседните “възли”, $x_i^{(N)} - x_{i-1}^{(N)}$, клонящи към θ (при $N \rightarrow \infty$). Ако I_*^0 и $I^{0,*}$ са съответно долният и горният интеграл на Дарбу за функцията $|f(x)|$, знаем, че $I^{0,*} - I_*^0 \leq S_N^0 - s_N^0$, за всяка двойка суми S_N^0, s_N^0 . От тук и (1.7) следва неравенството:

$$(1.8) \quad I^{0,*} - I_*^0 \leq S_N - s_N.$$

В (1.8) ще извършим граничен преход, при $N \rightarrow \infty$; понеже, съгласно теоремата на Дарбу -- за функцията $f(x)$ (която по условие е интегрируема) имаме, че $S_N - s_N \rightarrow 0 (N \rightarrow \infty)$, от (1.8) заключаваме: $0 \leq I^{0,*} - I_*^0 \leq 0$, т.е. $I^{0,*} - I_*^0 = 0$. Следователно функцията $|f(x)|$ е интегрируема.

Остава да докажем неравенството на триъгълника. За целта е достатъчно да интегрираме почленно, съгласно *Твърдение 3*, всяко от очевидните неравенства $f(x) \leq |f(x)|$ и $-f(x) \leq |f(x)|$, валидни $\forall x \in [a, b]$, откъдето получаваме, че

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx \quad \text{и} \quad -\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx,$$

т.е. в сила е (1.6).

С това *Твърдение 4* е доказано.

Забележка. За произволна двойка числа $x_1, x_2 \in [a, b]$, независимо кое е по-голямото, от (1.6) непосредствено стигаме до следната по-обща форма на неравенството на триъгълника:

$$(1.9) \quad \left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| \leq \left| \int_{x_1}^{x_2} |f(x)| dx \right|.$$

Наистина, ако например $x_1 > x_2$, прилагайки (1.6) за интервала $[x_2, x_1]$, имаме, че

$$\left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| = \left| \int_{x_2}^{x_1} f(x) dx \right| \leq \left| \int_{x_2}^{x_1} |f(x)| dx \right| = \left| \int_{x_1}^{x_2} |f(x)| dx \right|.$$

2. Интегрална теорема за средните стойности.

Тук ще разгледаме едно следствие (и аналог) на известната *Теорема на Болцано за междинните стойности* на непрекъснатите функции.

Твърдение (Теорема за средните стойности). Ако $f(x)$ и $\varphi(x)$ са непрекъснати функции в интервала $[a, b]$ като $\varphi(x)$ не си мени знака в този интервал, в смисъл че или $\varphi(x) \geq 0$, или $\varphi(x) \leq 0$, $\forall x \in [a, b]$, то съществува такава т. $\xi \in [a, b]$, за която е изпълнено равенството:

$$(2.1) \quad \int_a^b f(x)\varphi(x) dx = f(\xi) \int_a^b \varphi(x) dx .$$

За да докажем твърдението, да означим с M и m съответно максимума и минимума на $f(x)$ в интервала $[a, b]$; съгласно известната *Теорема на Вайерщрас* (за непрекъснати функции) величините M и m са в частност две (екстремални) стойности на функцията $f(x)$ (за интервала $[a, b]$). За $f(x)$ е в сила неравенството:

$$(2.2) \quad m \leq f(x) \leq M, x \in [a, b]$$

Нека например $\varphi(x) \leq 0$, $\forall x \in [a, b]$. Умножавайки почленно (2.2) с $\varphi(x)$, имаме че $m\varphi(x) \geq f(x)\varphi(x) \geq M\varphi(x)$, $x \in [a, b]$, след което интегрираме почленно последната двойка неравенства (съгласно *Твърдение 3*) и получаваме:

$$(2.3) \quad m \int_a^b \varphi(x) dx \geq \int_a^b f(x)\varphi(x) dx \geq M \int_a^b \varphi(x) dx .$$

В последната двойка неравенства множителят $\int_a^b \varphi(x) dx$ е неположителна величина (от предположението $\varphi(x) \leq 0$, $\forall x \in [a, b]$). Наистина, всяка Риманова интегрална сума за функцията $\varphi(x)$ е всъщност сума от неположителни числа, а интересуваният ни интеграл (от $\varphi(x)$) е граница на Риманови интегрални суми; тогава, след граничен преход ($n \rightarrow \infty$) в неравенства от вида $\sigma_n \leq 0$, се убеждаваме, че споменатият интеграл е ≤ 0 . Ако $\int_a^b \varphi(x) dx = 0$, от (2.3) е ясно, че

и $\int_a^b f(x)\varphi(x) dx$ е нула и (2.1) ще е изпълнено за всяка т. ξ от интервала $[a, b]$.

Когато $\int_a^b \varphi(x) dx < 0$, почленно делим в неравенствата (2.3) на числото $\int_a^b \varphi(x) dx$ и получаваме следното:

$$(2.4) \quad m \leq \frac{\int_a^b f(x)\varphi(x) dx}{\int_a^b \varphi(x) dx} \leq M .$$

Но частното на двата интеграла в (2.4) е едно число λ между стойностите m и M на функцията $f(x)$; тогава от споменатата теорема на Болцано (за междинните стойности) следва, че съществува поне една т. $\xi \in [a, b]$, такава че $f(\xi) = \lambda$, т.е.

$$f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)\varphi(x) dx}{\int_a^b \varphi(x) dx},$$

с което доказателството на теоремата е завършено.

Случаят $\varphi(x) \geq 0$ се изследва аналогично, но е малко по-прост, предвид че при почленното умножаване на изходните неравенства (2.2) (и на следващите) не се обръща посоката на съответните неравенства.

Забележка. Теоремата за средните стойности е в сила и без изискването $\varphi(x)$ да бъде непрекъсната функция (достатъчно е да бъде интегрируема).

3. Интеграл с променлива (подвижна) граница – теорема на Нютон-Лайбниц.

Ако функцията $f(x)$ е дефинирана и интегрируема в интервала $[a, b]$ и x_0 е някаква фиксирана точка (число) от този интервал, ще разглеждаме интеграл от вида $\int_{x_0}^x f(t) dt$, където $x \in [a, b]$ е произволно (фиксирано) число от интервала.

Ясно е, че съпоставяйки на всяко $x \in [a, b]$ стойността на интеграла $\int_{x_0}^x f(t) dt$, получаваме всъщност една нова функция $F(x)$, дефинирана (за всяко x) в интервала $[a, b]$, $F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt$. Първите два въпроса, естествено възникващи за функцията $F(x)$, са дали е непрекъсната и дали е диференцируема. Последователно ще се спрем на всеки от тях.

а). Непрекъснатост на функцията $F(x)$.

Твърдение. Ако функцията $f(x)$ е интегрируема в интервала $[a, b]$, функцията $F(x)$ е непрекъсната в този интервал.

Доказателство. За произволна стойност на аргумента $x \in [a, b]$ ще дадем нарастване h , така че $x+h \in [a, b]$ и ще разгледаме нарастването $F(x+h) - F(x)$. Предвид дефиницията за непрекъснатост, достатъчно е да установим, че $F(x+h) - F(x) \rightarrow 0$, когато $h \rightarrow 0$. За целта посредством дефиниционната

формула $F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt$ интересуващото ни нарастване преработваме по следния

начин:

$$F(x+h) - F(x) = \int_{x_0}^{x+h} f(t) dt - \int_{x_0}^x f(t) dt = \int_x^{x+h} f(t) dt;$$

използвали сме свойството *адитивност* на определените интеграли. Сега от *неравенството на триъгълника* имаме:

$$|F(x+h) - F(x)| = \left| \int_x^{x+h} f(t) dt \right| \leq \left| \int_x^{x+h} |f(t)| dt \right|.$$

Тъй като функцията $f(x)$ е ограничена (за $x \in [a, b]$), съществува (неотрицателна) константа C , така че $|f(t)| \leq C, \forall t \in [a, b]$. Последното неравенство интегрираме почленно в граници от x до $x+h$; ако например $h < 0$ (тогава $x+h < x$), съгласно свойството за *почленно интегриране на неравенства* получаваме:

$$\left| \int_x^{x+h} |f(t)| dt \right| = \int_{x+h}^x |f(t)| dt \leq \int_{x+h}^x C dt = C \int_{x+h}^x dt = C(x - (x+h)) = C|h|,$$

т.е., като следствие от неравенството $|f(t)| \leq C$, имаме, че $\left| \int_x^{x+h} f(t) dt \right| \leq C|h|$. От тук и вече полученото за $|F(x+h) - F(x)|$ (по-горе), установяваме следното:

$$|F(x+h) - F(x)| \leq \left| \int_x^{x+h} |f(t)| dt \right| \leq C|h|;$$

т.е. за интересувашото ни нарастване на функцията $F(x)$ е в сила двойното неравенство

$$(3.1) \quad 0 \leq |F(x+h) - F(x)| \leq C|h|.$$

В (3.1) x е фиксирано и участващите величини разглеждаме като функции на h ; при $h \rightarrow 0$, съгласно известното правило за граничен преход в неравенства между функции, от (3.1) заключаваме, че $F(x+h) - F(x) \rightarrow 0$ ($h \rightarrow 0$). Т.е. функцията F е непрекъсната в т. x , която обаче беше произволно фиксирана в интервала $[a, b]$, значи F е непрекъсната в интервала (което имахме да докажем).

б). Диференцируемост на $F(x)$ -- теорема на Нютон-Лайбниц.

Най-напред нека отбележим, че ако съществува производната $F'(x)$, естествено е да очакваме, че $F'(x) = f(x)$. Това всъщност е една класически възникнала догадка – по повод на т.н. *проблем за квадратурите* (т.е. – за лицата на равнинни фигури, оградени от графики на функции). Ако например $f(t) > 0, \forall t \in [a, b]$, $x > x_0$ и $h > 0$, от геометричния смисъл на определените интеграли е ясно, че $F(x)$ -- това е лицето на фигурата (от типа “криволинеен трапец”), разположена между вертикалните прави $t = x_0$ и $t = x$, оградена отгоре от графиката на функцията $y = f(t), x_0 \leq t \leq x$, а отдолу – от отсечката (от абсцисната ос) $y = 0, x_0 \leq t \leq x$; $F(x+h) - F(x)$ -- това е нарастването на гореописаната площ, когато променливата x е получила изменение (нарастване)

със стойност h – до нова стойност $x+h$. Ако означим за удобство с T^0 криволинейния трапец с лице $F(x)$ (описан по-горе), ясно е, че $F(x+h) - F(x)$ е също лице на такъв трапец – да го означим с ΔT^0 , “долепен” до трапеца T^0 . При това обединението $T^* = T^0 \cup \Delta T^0$ е криволинейният трапец, аналогичен на T^0 , с лице $F(x+h)$. С други думи, ΔT^0 е нарастването на трапеца T^0 до новото “състояние” T^* . Трапецът ΔT^0 става “безкрайно” тесен, когато h е “почти” 0 ; тогава неговото лице става “несъществено” различно от лицето на вписания в (или описан около) него правоъгълник с основа отсечката $y=0, x_0 \leq t \leq x$ и височина $f(x)$. Понеже лицето на правоъгълника е $h \cdot f(x)$, от така изложените интуитивни съображения заключаваме, че $F(x+h) - F(x) \approx h \cdot f(x)$; тогава $\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \approx f(x), \Rightarrow \exists F'(x) = f(x)$ (предвид че, от “практическа” гледна точка $\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \approx F'(x)$, когато $F'(x)$ съществува). Коментиранията по-горе догадка получава своето строго потвърждение именно чрез теоремата на Нютон-Лайбниц, която ще разгледаме в традиционната ѝ по-обща форма:

Твърдение (Нютон-Лайбниц). Ако функцията $f(x)$ е интегрируема в интервала $[a, b]$ и е непрекъсната в дадена т. $x = \xi$ от този интервал, тогава функцията $F(x)$ е диференцируема в тази точка и за производната ѝ $F'(\xi)$ имаме, че $F'(\xi) = f(\xi)$.

Доказателство. Като имаме предвид дефиницията на производна, трябва да докажем, че диференчното частно $\frac{F(\xi+h) - F(\xi)}{h}$ има (крайна) граница, при $h \rightarrow 0$ ($h \neq 0$). За да установим едновременно с това дали тази граница е $f(\xi)$ (предвид коментиранията по-горе хипотеза), ще изследваме разликата $\frac{F(\xi+h) - F(\xi)}{h} - f(\xi)$. От вече известните пресмятания за нарастването

$F(x+h) - F(x)$ имаме, че $\frac{F(\xi+h) - F(\xi)}{h} = \frac{1}{h} \cdot \int_{\xi}^{\xi+h} f(x) dx$ и освен това

$f(\xi) = \frac{f(\xi)}{h} \cdot \int_{\xi}^{\xi+h} dx = \frac{1}{h} \cdot \int_{\xi}^{\xi+h} f(\xi) dx$. (В последното равенство сме използвали, че

$\frac{1}{h} \cdot \int_{\xi}^{\xi+h} dx = 1$ и че $f(\xi)$ е числов множител, който можем да внесем под знака на

съответния интеграл.) Следователно

$$(3.2) \left| \frac{F(\xi+h) - F(\xi)}{h} - f(\xi) \right| = \left| \frac{1}{h} \cdot \int_{\xi}^{\xi+h} [f(x) - f(\xi)] dx \right| \leq \frac{1}{|h|} \left| \int_{\xi}^{\xi+h} |f(x) - f(\xi)| dx \right|.$$

(Тук очевидно сме използвали свойството *линейност* на определените интеграли и *неравенството на триъгълника*.) Предположението за непрекъснатост на $f(x)$ в т. $x = \xi$ означава, че $\forall \varepsilon > 0$ съществува число $\delta > 0$, така че е в сила неравенството $|f(x) - f(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall x: |x - \xi| < \delta, x \in [a, b]$ (съгласно известната дефиниция на Коши за непрекъснатост на функция). Нататък е достатъчно да

предполагаме, че $|h| < \delta$; тогава $|f(x) - f(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall x$ от интервала между точките ξ и $\xi + h$. Интегрирайки последното неравенство в този интервал, получаваме:

$$\frac{1}{|h|} \left| \int_{\xi}^{\xi+h} |f(x) - f(\xi)| dx \right| \leq \frac{1}{|h|} \int_{\xi}^{\xi+h} \frac{\varepsilon}{2} dx = \frac{\varepsilon}{2|h|} \left| \int_{\xi}^{\xi+h} dx \right| = \frac{\varepsilon}{2|h|} \cdot |h| = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

откъдето, предвид (3.2), следва:

$$(3.3) \quad \left| \frac{F(\xi+h) - F(\xi)}{h} - f(\xi) \right| < \varepsilon, \forall h: |h| < \delta (h \neq 0, \xi+h \in [a, b]).$$

Понеже числото ε е произволно (малко), неравенството (3.3) означава (от дефиницията за производна -- във формата на Коши), че функцията $F(x)$ е диференцируема в т. ξ и $F'(\xi) = f(\xi)$ (което трябваше да се докаже).

Коментар. Следващите няколко твърдения илюстрират съществената практическа значимост на теоремата на Нютон-Лайбниц. Всяко от тях може да се разглежда като приложен вариант на основната тема. Това са основните

СЛЕДСТВИЯ ОТ ТЕОРЕМАТА НА НЮТОН-ЛАЙБНИЦ:

в). *Съществуване на неопределени интеграли от непрекъснати функции.*

От таблицата на неопределените интеграли знаем, че съществуват функции (такива са тъкмо познатите ни от таблицата *основни елементарни функции*), които притежават примитивни (т.е. неопределени интеграли). От гледна точка на основните (вече класически) идеи, в развитието на математическия анализ е полезно да обърнем внимание на съществените (в т.ч. и за приложенията) по-общ въпрос -- съществува ли достатъчно широк клас от функции, които имат примитивни.

Твърдение. Всяка непрекъсната в даден интервал Δ функция $f(x)$ притежава примитивна в този интервал.

Доказателство. Най-напред да отбележим, че интервалът Δ е произволен -- краен или безкраен, отворен или затворен и пр. Ако фиксираме произволна т. $x_0 \in \Delta$, функцията $F(x) \equiv \int_{x_0}^x f(t) dt$ е очевидно дефинирана за всяко $x \in \Delta$, предвид че интервалът $[x_0, x]$ (или $[x, x_0]$, когато $x < x_0$) е краен и затворен и се съдържа в Δ ; следователно определеният интеграл $\int_{x_0}^x f(t) dt$ съществува (тъй като подинтегралната функция f е непрекъсната в $[x_0, x]$ (или $[x, x_0]$)). Сега оставяйки x да се мени в произволен подинтервал (краен и затворен) $[a, b] \subset \Delta$, съдържащ т. x_0 , от теоремата на Нютон-Лайбниц имаме, че $F(x)$ притежава производна $\forall x \in \Delta$ и $F'(x) = f(x), x \in \Delta$. Т.е. функцията $F(x)$ е примитивна за $f(x)$ в интервала Δ .

Коментар. Ясно е, че ще получим цяла фамилия примитивни от вида $\int_{x_0}^x f(t) dt$, ако на x_0 гледаме като на параметър, който може да приема на свой ред произволни стойности от интервала Δ . Разнообразието от примитивни очевидно се разширява с прибавяне на произволни константи (т.е. функциите от вида $\int_{x_0}^x f(t) dt + C$, C -- константа, също са примитивни за $f(x)$). От т.н. *основна теорема на интегралното смятане* (известна още като *критерий за константност*) знаем, че по този начин получаваме всъщност описание за всички възможни примитивни (в даден интервал) на дадена функция $f(x)$. Това допълнение на горния резултат разглеждаме по-долу като самостоятелно твърдение.

г). *Връзка между определени и неопределени интеграли.*

Въпросната връзка се изразява чрез популярната формула

$$(3.4) \quad \int f(x) dx = \int_{x_0}^x f(t) dt + C.$$

Тъкмо тази формула се среща понякога под името “теорема на Нютон-Лайбниц” (тя е всъщност практическата версия на теоремата). Формулата показва, че (за непрекъснати функции) всеки неопределен интеграл, с точност до *адитивна* (т.е. “добавъчна” – чрез действието *събиране*) константа, е определен интеграл с подвижна граница. Има се предвид следното

Твърдение. Ако $f(x)$ е непрекъснатата функция в даден интервал Δ и $x_0 \in \Delta$ е произволна фиксирана т. от интервала, то всяка функция от вида $\int_{x_0}^x f(t) dt + C$, за всяка константа C , е примитивна за $f(x)$ (в Δ) и обратно – за всяка примитивна на $f(x)$ в Δ съществува константа C , така че е в сила (3.4).

Доказателството на твърдението фактически се съдържа в казаното по-горе. Наистина, в т.в) вече отбелязахме, че всяка функция $F_C \equiv \int_{x_0}^x f(t) dt + C$ е примитивна за $f(x)$. Обратно, ако $\phi(x) \equiv \int f(x) dx$ е произволна примитивна на $f(x)$ в Δ , предвид че и функцията $F(x) \equiv \int_{x_0}^x f(t) dt$ е такава, заключаваме по очевиден начин, че разликата $R(x) \equiv \phi(x) - F(x)$ е функция, чиято производна $R'(x)$ е нула в интервала Δ ($R'(x) = \phi'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$). Следователно, от *основната теорема на интегралното смятане*, $R(x)$ е константа в Δ , т.е. $R(x) \equiv C$ (в Δ) за някаква константа C , т.е. в сила е (3.4).

д). *Пресмятане на определени интеграли чрез неопределени.*

В пресмятането на определени интеграли с традиционния символ $G(x)|_a^b$ означаваме разликата (нарастването) $G(b) - G(a)$ -- за дадена функция $G(x)$,

дефинирана в интервал, който съдържа числата a и b . Когато използваме това означение, можем да казваме, че *функцията $G(x)$ е пресметната (или взета) в граници от a до b .*

Твърдение. Ако $f(x)$ е непрекъснатата функция в интервала Δ , $x_1, x_2 \in \Delta$ са фиксирана двойка числа и $\phi(x)$ е произволна примитивна (неопределен интеграл) на $f(x)$ в Δ , в сила е следното равенство:

$$(3.5) \quad \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = \phi(x) \Big|_{x_1}^{x_2} .$$

Доказателство. От (3.4) вече знаем, че $\phi(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt + C$, където $x_0 \in \Delta$ е някакво фиксирано число; тогава

$$\phi(x) \Big|_{x_1}^{x_2} = \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx + C - \left[\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx + C \right] = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx ,$$

като сме взели предвид свойството *адитивност* на определените интеграли. С това правилото (3.5) е доказано.